

獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 IsaKd (Isa 10mg/kg・Cfz 20mg/m2)

レジメン番号 005232 1コースの日数 7

レジメン内容

内服コメント		Isa投与開始前、アトミノフェン 600mg 併用							Day						
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	2	7 休							
1	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液 6.6 mg 〔2mL/瓶〕 ポララミン注 5 mg 〔5mg/1mL〕	100mL 19.8mg 5mg	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 サークリサ点滴静注	250mL 10mg/kg	点滴注射 (D I V)		サークリサ用量分の生食を抜き最終量を250mLとする インラインフィルター使用 投与速度は指示簿、メモ参照	○									
4	大塚糖液 5% 〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○									
5	光糖液 5% 〔100mL/瓶〕 注射用水 P L 「フリ-」 〔20mL/A〕 カイプロリス点滴静注用	100mL 20mL 20mg/ml	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○									
6	大塚糖液 5% 〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○									
1	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液 6.6 mg 〔2mL/瓶〕	100mL 19.8mg	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○									
2	大塚糖液 5% 〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○									
3	光糖液 5% 〔100mL/瓶〕 注射用水 P L 「フリ-」 〔20mL/A〕 カイプロリス点滴静注用	100mL 20mL 20mg/ml	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○									
4	大塚糖液 5% 〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○									