

獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名	IsaKd (Isa 10mg/kg・Cfz 56mg/m2)		
レジメン番号	005233	1コースの日数	7

レジメン内容

内服コメント		Isa投与開始前、アトミノフィン 600mg 併用													
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	2	7 休							
1	生理食塩液「比加」〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液 6.6 mg〔2mL/瓶〕 ポララミン注 5 mg〔5mg/1mL〕	100m L 19.8m g 5m g	点滴注射（D I V）	注入時間 30分		○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（D I V）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 サークリサ点滴静注	250m L 10m g/kg	点滴注射（D I V）		サークリサ用量分の生食を抜き最 終量を250mLとする インラインフィルター使用 投与速度は指示簿、メモ参照	○									
4	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（D I V）	注入時間 15分		○									
5	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕 注射用水〔100mL/瓶〕 カイプロリス点滴静注用	100m L 100m L 56m g/m ²	点滴注射（D I V）	注入時間 30分		○									
6	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（D I V）	注入時間 15分		○									
1	生理食塩液「比加」〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液 6.6 mg〔2mL/瓶〕	100m L 19.8m g	点滴注射（D I V）	注入時間 30分			○								
2	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（D I V）	注入時間 15分			○								
3	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕 注射用水〔100mL/瓶〕 カイプロリス点滴静注用	100m L 100m L 56m g/m ²	点滴注射（D I V）	注入時間 30分			○								
4	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（D I V）	注入時間 15分			○								