**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | |
|---|---|
| レジメン名 | 外来　Pola-R-CHP　2日間 |
| レジメン番号 | 005245 |
| 1コースの日数 | 21 |

レジメン内容

| 内服コメント | PSL 100mg/body day2-6 |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day 1 | 2 | 21<br>休 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 | 100ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | | ルートキープ用 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 50ｍＬ<br>100ｍｇ<br>1Ａ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」 | 337.5ｍＬ/㎡<br>375ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | | リツキシマブBS9倍量の生食で希釈<br>2回目以降、100mL/hr（1hr）で<br>開始→200mL/hr | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>グラニセトロン静注液１mg「ｻﾜｲ」〔1mg/1mL〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 50ｍＬ<br>1ｍｇ<br>1Ａ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 光糖液５％〔100mL/瓶〕<br>注射用水ＰＬ「ﾌｿｰ」〔20mL/Ａ〕<br>ポライビー点滴静注用３０mg〔30mg/瓶〕 | 100ｍＬ<br>20ｍＬ<br>1.8ｍｇ/㎏ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | インラインフィルター使用<br>初回90分、2回目以降30分 | | ○ | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 | 100ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | 初回90分、2回目以降30分 | | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 | 50ｍＬ<br>50ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>注射用エンドキサン | 500ｍＬ<br>750ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 2時間 | | | ○ | | | | | | | | |
| 7 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |