獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	CBDCA+VP-16+ｱﾃﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ		
レジメン番号	007063	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	4ｻｲｸﾙ施行後、ｱﾃﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞの維持療法															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	2	3	21 休							
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０.７５mg/５mL「ﾀｲﾎｳ」 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100m L 235m g 0.75m g 6.6m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 5分		○										
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 テセントリク点滴静注１２００mg〔1200mg/20mL〕	250m L 1200m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	初回60分、2回目以降30分 インラインフィルター使用	○										
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○										
5	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 エトポシド点滴静注液１００mg「SN」〔100mg/5mL〕	250m L 100m g /㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○										
6	大塚生食注〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250m L AUC= 5	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○										
1	大塚生食注〔50mL/瓶〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	50m L 6.6m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○	○								
2	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 エトポシド点滴静注液１００mg「SN」〔100mg/5mL〕	250m L 100m g /㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用		○	○								
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○	○								