**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ＋ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ：維持療法　ｱﾚ内 | | |
| レジメン番号 | 007110 | 1コースの日数 | 21 |

レジメン内容

| 内服コメント | 初回投与7日以上前から葉酸0.5mg（1日1回連日経口投与）及びﾋﾞﾀﾐﾝB12（9週毎に1回1mgを筋注）を投与 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 21<br>休 | | | | | | | | | |
| 1 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕 | 50ｍL<br>6.6ｍg | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50ｍL | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 5分 | | ○ | | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>キイトルーダ点滴静注１００mg〔100mg/4mL〕 | 50ｍL<br>200ｍg | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | インラインフィルター使用 | ○ | | | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50ｍL | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕<br>ペメトレキセド点滴静注液「NK」 | 100ｍL<br>500ｍg/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 10分 | | ○ | | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50ｍL | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |