獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	9LA②ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ抜き：CDDP+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ		
レジメン番号	007119	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	初回投与7日以上前から葉酸0.5mg（1日1回連日経口投与）及びﾋﾞﾀﾐﾝB12（9週毎に1回1mgを筋注）を投与															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	21 休									
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100mL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○										
2	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 オプジーボ点滴静注	100mL 360mg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○										
3	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０.７５mg/５mL「ﾀｲﾎｳ」 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100mL 235mg 0.75mg 3.3mg 6.6mg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
4	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 ペメトレキセド点滴静注液「NK」	100mL 500mg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 10分		○										
5	大塚生食注〔500mL/袋〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500mL 20mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
6	ラクテック注〔500mL/袋〕	500mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
7	２０％マンニットール注射液「YD」〔300mL/袋〕	300mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
8	大塚生食注〔250mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	250mL 75mg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	調製後全量450mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製	○										
9	大塚生食注〔500mL/袋〕	500mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
10	ラクテック注〔500mL/袋〕	500mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										