**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS(顕微鏡的多発血管炎) | | |
| レジメン番号 | 007962 | 1コースの日数 | 7 |

レジメン内容

| 内服コメント | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 7<br>休 | | | | | | | | |
| 1 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 50m L<br>200m g<br>1 A | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」 | 337.5m L /㎡<br>375m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | | リツキシマブBS9倍量の生食で希釈<br>速度指示簿、メモ参照 | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |