獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　外来　ﾎﾟｰﾄ　FOLFIRI+ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ（2回目以降）

レジメン番号　021068　　1コースの日数　14

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	14 休							
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○	○								
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６．６ｍｇ〔2mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０ｍｇ〔10mg/1mL〕	100ｍＬ 0.75ｍｇ 6.6ｍｇ 1Ａ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 アービタックス注射液１００ｍｇ〔100mg/20mL〕	250ｍＬ 250ｍｇ/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間		○	○								
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		アービタックスと同じ速度でフラッシュ	○									
5	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250ｍＬ 150ｍｇ/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
6	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 レボホリナート点滴静注用	250ｍＬ 200ｍｇ/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	イリノテカンと同時開始	○									
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50ｍＬ 400ｍｇ/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
8	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50ｍＬ 2400ｍｇ/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整	○									
9	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０ｍｇ〔10mg/1mL〕	100ｍＬ 1Ａ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分			○								
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間			○								