**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | 外来　ﾎﾟｰﾄ　fos　FOLFIRI+ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ（初回） | | |
| レジメン番号 | 021212 | 1コースの日数 | 14 |

レジメン内容

| 内服コメント | |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day<br>1 | 8 | 14<br>休 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 | 100m L | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | | ルートキープ用 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕<br>パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣<br>デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 100m L<br>235m g<br>0.75m g<br>6.6m g<br>1 A | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 5分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>アービタックス注射液１００mg〔100mg/20mL〕 | 500m L<br>400m g /㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 2時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | | アービタックスと同じ速度でフラッシュ | ○ | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 250m L<br>150m g /㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 2時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>レボホリナート点滴静注用 | 250m L<br>200m g /㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 2時間 | イリノテカンと同時開始 | ○ | | | | | | | | | |
| 8 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>フルオロウラシル注 | 50m L<br>400m g /㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 5分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 9 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>フルオロウラシル注 | 50m L<br>2400m g /㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 46時間 | インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整 | ○ | | | | | | | | | |
| 10 | ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL | 1筒 | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 100m L<br>1 A | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 30分 | | | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔250mL/袋〕<br>アービタックス注射液１００mg〔100mg/20mL〕 | 250m L<br>250m g /㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 1時間 | | | ○ | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 | 100m L | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 1時間 | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |