獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　外来　ﾎﾟｰﾄ　fos　FOLFIRI+ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ（2回目以降）

レジメン番号　021214　　1コースの日数　14

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	14 休							
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○	○								
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
	アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕	235ｍｇ													
	パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣	0.75ｍｇ													
	デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	6.6ｍｇ													
2	ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	1Ａ													
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
	大塚生食注〔250mL/袋〕	250ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間		○									
4	アービタックス注射液１００mg〔100mg/20mL〕	250ｍｇ/㎡													
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		アービタックスと同じ速度でフラッシュ	○									
5															
	大塚糖液５％〔250mL/袋〕	250ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
6	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150ｍｇ/㎡													
	大塚糖液５％〔250mL/袋〕	250ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	イリノテカンと同時開始	○									
7	レボホリナート点滴静注用	200ｍｇ/㎡													
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
8	フルオロウラシル注	400ｍｇ/㎡													
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整	○									
9	フルオロウラシル注	2400ｍｇ/㎡													
10	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			○									
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分			○								
2	ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	1Ａ													
	大塚生食注〔250mL/袋〕	250ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間			○								
3	アービタックス注射液１００mg〔100mg/20mL〕	250ｍｇ/㎡													
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間			○								