獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　ﾎﾟｰﾄ　fos　FOLFIRI+ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ		
レジメン番号	021216	1コースの日数	14

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	14 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○									
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100m L													
	アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕	235m g													
	パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣	0.75m g	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
	デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	6.6m g													
2	ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	1A													
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
	大塚生食注〔250mL/袋〕	250m L			インラインフィルター使用										
4	サイラムザ点滴静注液	8m g /kg	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間	初回60分、2回目以降30分	○									
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 15分		○									
	大塚糖液５%〔250mL/袋〕	250m L													
6	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
	大塚糖液５%〔250mL/袋〕	250m L													
7	レボホリナート点滴静注用	200m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	イリノテカンと同時開始	○									
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L													
8	フルオロウラシル注	400m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L			インフューザーポンプで投与できる										
9	フルオロウラシル注	2400m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	よう適宜生食調整	○									
10	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			○									