**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | 外来ﾎﾟｰﾄfosFOLFOXIRI+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS CPT-11 165・FU3200 | | |
| レジメン番号 | 021220 | 1コースの日数 | 14 |

レジメン内容

| 内服コメント | 12ｺｰｽ終了後、13ｺｰｽ目からはCPT-11、L-OHPを抜いて投与継続 |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day<br>1 | 14<br>休 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 | 100mL | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | | ルートキープ用 | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕<br>パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣<br>デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 100mL<br>235mg<br>0.75mg<br>6.6mg<br>1A | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50mL | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 5分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>ベバシズマブＢＳ点滴静注 | 100mL<br>5mg/kg | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 1時間30分 | 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 250mL<br>165mg/㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 1時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>オキサリプラチン点滴静注液 | 250mL<br>85mg/㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 2時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>レボホリナート点滴静注用 | 250mL<br>200mg/㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 2時間 | オキサリプラチンと同時開始 | ○ | | | | | | | | | |
| 8 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>フルオロウラシル注 | 50mL<br>3200mg/㎡ | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | 注入時間 46時間 | インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整 | ○ | | | | | | | | | |
| 9 | ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL | 1筒 | 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |