獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来ﾎﾟｰﾄfosFOLFOXIRI+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS CPT-11 150・FU3000		
レジメン番号	021241	1コースの日数	14

レジメン内容

内服コメント	12ｺｰｽ終了後、13ｺｰｽ目からはCPT-11、L-OHPを抜いて投与継続

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	14 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣ デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100m L 235m g 0.75m g 6.6m g 1A	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ベバシズマブＢＳ点滴静注	100m L 5m g /kg	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間30分	初回90分、2回目60分、3回目以降30分	○									
5	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250m L 150m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間		○									
6	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 オキサリプラチン点滴静注液	250m L 85m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
7	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 レボホリナート点滴静注用	250m L 200m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	オキサリプラチンと同時開始	○									
8	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50m L 3000m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整	○									
9	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			○									