獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	DIV　XELOX＋ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ(2回目以降)		
レジメン番号	021316	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 2000mg/m2/日 分2 day1夕-day15朝内服 2投1休、day2-Dex 8mg 3TD、(必要時)ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 5mg内服

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	21 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０．７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣ デカドロン注射液３．３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕 ポララミン注５mg〔5mg/1mL〕	100ｍＬ 235ｍｇ 0.75ｍｇ 3.3ｍｇ 6.6ｍｇ 5ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 注射用水〔100mL/瓶〕 ビロイ点滴静注用１００mg〔100mg/瓶〕	270ｍＬ/㎡ 100ｍＬ 600ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）		インラインフィルター使用 希釈濃度2.0mg/mLになるように調製 投与速度:(0-30分)60mL/h→(30-90分)130mL/h→ (90分以降)200mL/h	○									
4	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 オキサリプラチン点滴静注液	250ｍＬ 130ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 2時間		○									
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									