獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	ﾎﾟｰﾄ　XELOX＋ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ(2回目以降)		
レジメン番号	021317	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 2000mg/m2/日 分2 day1夕-day15朝内服 2投1休、day2-Dex 8mg 3TD、(必要時)ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 5mg内服															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	21 休									
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○										
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０．７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣ デカドロン注射液３．３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕 ポララミン注５mg〔5mg/1mL〕	100m L 235m g 0.75m g 3.3m g 6.6m g 5m g	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○										
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 注射用水〔100mL/瓶〕 ビロイ点滴静注用１００mg〔100mg/瓶〕	270m L /㎡ 100m L 600m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		インラインフィルター使用 希釈濃度2.0mg/mLになるように調製 投与速度:(0-30分)60mL/h→(30-90分)130mL/h→ →(90分以降)200mL/h	○										
4	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 オキサリプラチン点滴静注液	250m L 130m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○										
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 15分		○										