**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | DIV　XP | | |
| レジメン番号 | 021125 | 1コースの日数 | 21 |

レジメン内容

| 内服コメント | ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 2000mg/m2/日 分2 day1夕-day15朝内服 2投1休 |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day 1 | 21<br>休 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルラクト輸液〔500mL/袋〕<br>アスパラギン酸カリウム注１０mEqｷｯﾄ〔10mL/ｷｯﾄ〕<br>硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕 | 500ｍＬ<br>10ｍＬ<br>8ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 2時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 5分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕 | 100ｍＬ<br>150ｍｇ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕<br>デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕<br>デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 | 100ｍＬ<br>0.75ｍｇ<br>3.3ｍｇ<br>6.6ｍｇ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | ２０％マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕 | 100ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 20分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>シスプラチン点滴静注 | 500ｍＬ<br>80ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 2時間 | 調製後全量700mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製 | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | ソルラクト輸液〔1000mL/袋〕<br>アスパラギン酸カリウム注１０mEqｷｯﾄ〔10mL/ｷｯﾄ〕<br>硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕 | 1袋<br>10ｍＬ<br>8ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 2時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 8 | ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕 | 500ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | | 翌朝までkeep | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |