獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	ﾎﾟｰﾄ　XP+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS（初回）		
レジメン番号	021128	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 2000mg/m2/日 分2 day1夕-day15朝内服 2投1休

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	21 休								
1	ソルラクト輸液〔500mL/袋〕 アスパラギン酸カリウム注１０mEqｷｯﾄ〔10mL/ｷｯﾄ〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500ｍＬ 10ｍＬ 8ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕	100ｍＬ 150ｍｇ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100ｍＬ 0.75ｍｇ 3.3ｍｇ 6.6ｍｇ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
5	大塚生食注〔250mL/袋〕 トラスツズマブＢＳ点滴静注用	250ｍＬ 8ｍｇ/kg	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間30分		○									
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 15分		○									
7	２０%マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕	100ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 20分		○									
8	大塚生食注〔500mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	500ｍＬ 80ｍｇ/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	調製後全量700mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製	○									
9	ソルラクト輸液〔1000mL/袋〕 アスパラギン酸カリウム注１０mEqｷｯﾄ〔10mL/ｷｯﾄ〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	1袋 10ｍＬ 8ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
10	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍＬ	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		翌朝までkeep	○									