**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | CDDP＋PEM（short hydration） 呼外 | | |
| レジメン番号 | 023041 | 1コースの日数 | 28 |

レジメン内容

| 内服コメント | 初回7日以上前から葉酸0.5mg/日及びVitB12(9週間に１回1mg筋注)。当日ラシックス20mg、投与翌日40mg内服。 |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day<br>1 | 28<br>休 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕<br>アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕<br>デカドロン注射液３．３mg〔1mL/A〕<br>デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕 | 250m L<br>150m g<br>0.75m g<br>3.3m g<br>6.6m g | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 45分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>アリムタ注射用 | 100m L<br>500m g/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 10分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕<br>硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕 | 500m L<br>10m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | ２０％マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕 | 300m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>シスプラチン点滴静注 | 500m L<br>75m g/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | 調製後全量700ml以上となる場合、適宜生食を抜き調製<br>入院時2時間で投与 | ○<br>○ | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>プリンペラン注射液10mg〔10mg/2mL〕 | 500m L<br>1Ａ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | ラクテックＧ輸液〔250mL/袋〕 | 250m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |