獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	CDDP+PEM+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(short hydration)　呼外		
レジメン番号	023042	1コースの日数	28

レジメン内容

内服コメント	初回7日以上前から葉酸0.5mg/日及びVitB12(9週間に１回1mg筋注)。投与当日ラシックス20mg、翌日40mg内服。

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	28 休								
1	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	250m L 150m g 0.75m g 3.3m g 6.6m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 45分		○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アリムタ注射用	100m L 500m g /㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 10分		○									
3	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500m L 10m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
4	２０％マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕	300m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
5	大塚生食注〔500mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	500m L 75m g /㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	調製後全量700ml以上となる場合、適宜生食を抜き調製 入院時2時間で投与	○									
6	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アバスチン点滴静注用	100m L 15m g /kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○									
7	大塚生食注〔500mL/袋〕 プリンペラン注射液10mg〔10mg/2mL〕	500m L 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
8	ラクテックＧ輸液〔250mL/袋〕	250m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									