獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ(肝細胞がん)

レジメン番号　024012　　1コースの日数　21

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	21 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○									
2	大塚生食注〔250mL/袋〕 テセントリク点滴静注１２００mg〔1200mg/20mL〕	250ｍL 1200ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用 初回60分、2回目以降30分	○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アバスチン点滴静注用	100ｍL 15ｍg/kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分	初回90分、2回目60分、3回目以降30分	○									
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾌﾞﾏﾌﾞ（肝細胞がん）

レジメン番号　024011　　1コースの日数　21

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	21 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ、フラッシュ用	○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液６．６ｍｇ〔2mL/瓶〕 プリンペラン注射液10mg〔10mg/2mL〕	100ｍL 6.6ｍｇ 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕 オプジーボ点滴静注	20ｍL 1ｍｇ/kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
5	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ〔50mg/10mL〕	50ｍL 3ｍｇ/kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分	インラインフィルター使用	○									

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	CDDP+CPT-11(神経内分泌がん)		
レジメン番号	024010	1コースの日数	28

レジメン内容

内服コメント	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄもしくはﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	8	15	28 休						
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕	100ｍL 0.75ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○							
2	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	500ｍL 60ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○									
4	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○									
5	２０％マンニットール注射液「YD」〔300mL/袋〕	300ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
6	大塚生食注〔500mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	500ｍL 60ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 2時間	調製後全量700mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製	○									
7	ラクテック注〔500mL/袋〕 プリンペラン注射液10mg〔10mg/2mL〕	500ｍL 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○									
8	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○									
9	ラクテック注〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○									
2	大塚生食注〔500mL/袋〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	500ｍL 60ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分			○	○							
3	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分			○	○							

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　STZ単剤(毎週投与法)

レジメン番号　024009　　1コースの日数　7

レジメン内容

内服コメント	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	7 休									
1	テルモ生食〔1L/袋〕	1000ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 2時間		○										
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100ｍL 0.75ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ザノサー点滴静注用１g〔1g/瓶〕	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
4	大塚生食注〔250mL/袋〕	250ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	STZ単剤(5日連続法)		
レジメン番号	024008	1コースの日数	42

レジメン内容

内服コメント	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	2	3	4	5	42 休					
1	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 2時間		○	○	○	○	○						
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕	100ｍＬ 3ｍｇ 6.6ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○	○	○						
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ザノサー点滴静注用１ｇ〔1g/瓶〕	100ｍＬ 500ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○	○	○						
4	大塚生食注〔250mL/袋〕	250ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○	○	○	○	○						

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	STZ＋5FU		
レジメン番号	024007	1コースの日数	42

レジメン内容

内服コメント	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	2	3	4	5	42 休				
1	テルモ生食〔1L/袋〕	1000ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 2時間		○	○	○	○	○					
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100ｍL 3ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○	○	○					
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 フルオロウラシル注	100ｍL 400ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○	○	○					
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○	○	○	○					
5	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ザノサー点滴静注用１g〔1g/瓶〕	100ｍL 500ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○	○	○					
6	大塚生食注〔250mL/袋〕	250ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○	○	○	○	○					

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ（肝細胞がん）		
レジメン番号	024006	1コースの日数	14

レジメン内容

内服コメント																
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	14 休									
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液３．３mg〔1mL/A〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100ｍL 3.3ｍg 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
2	大塚生食注〔250mL/袋〕 サイラムザ点滴静注液	250ｍL 8ｍg/kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○										
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○										

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　GC(GEM+CDDP・胆道がん) 二外

レジメン番号　024005　　1コースの日数　21

レジメン内容

内服コメント	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	8	21 休								
1	フィジオ１４０輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○	○									
2	２０％マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕	300ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○	○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	50ｍL 0.75ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○									
4	大塚生食注〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分		○	○									
5	大塚生食注〔250mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	250ｍL 25ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○	○									
6	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	メインの生食500mL終了後GEM単独で投与	○	○									
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○									

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　FOLFIRINOX

レジメン番号　024004　　1コースの日数　14

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	14 休								
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕	100m L 150m g 0.75m g 3.3m g	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
2	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 オキサリプラチン点滴静注液	250m L 85m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
3	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 レボホリナート点滴静注用	250m L 200m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
4	大塚生食注〔250mL/袋〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250m L 180m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間30分	レボリナート開始後30分より投与開始	○									
5	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 フルオロウラシル注	100m L 400m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分	全開	○									
6	大塚生食注〔500mL/袋〕 フルオロウラシル注	500m L 2400m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間		○									

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	GN 二外		
レジメン番号	024003	1コースの日数	28

レジメン内容

内服コメント	Dex 0.5mg 2錠分1(朝食後) 2日間内服併用														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	8	15	28 休						
1	大塚生食注〔50mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕	50ｍL 0.75ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 5分		○	○	○							
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕 アブラキサン点滴静注用１００mg〔100mg/瓶〕	50ｍL 125ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	不要、インラインフィルター	○	○	○							
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○	○							
5	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○							
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○	○							

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	GEM (膵がん・胆道がん) 二外		
レジメン番号	024002	1コースの日数	28

レジメン内容

内服コメント															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	8	15	28 休						
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕	100ｍL 3ｍg 3.3ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○							
2	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○							
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○	○							

獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	GS(膵がん・胆道がん) 二外		
レジメン番号	024001	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	S-1 day1-day14 2投1休 BSA＜1.25：80mg、1.25≦BSA＜1.5：100mg、BSA≧1.5：120mg

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	8	21 休							
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕	100ｍL 3ｍg 3.3ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○								
2	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○								
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○								