獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ400mg+GC(GEM+CDDP・胆道がん)

レジメン番号　024019　　1コースの日数　42

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	22	29	42 休					
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注１００mg〔100mg/4mL〕	50ｍL 400ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
4	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	メイン	○									
5	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	メイン	○									
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１mg「ｻﾜｲ」〔1mg/1mL〕 デキサート注射液３.３mg〔3.3mg/1mL〕	50ｍL 1ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	側管	○									
7	大塚生食注〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	メイン	○									
8	大塚生食注〔250mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	250ｍL 25ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	側管	○									
9	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	側管	○									
10	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
1	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	メイン		○	○	○						
2	ソルデム３Ａ輸液〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	メイン		○	○	○						
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１mg「ｻﾜｲ」〔1mg/1mL〕 デキサート注射液３.３mg〔3.3mg/1mL〕	50ｍL 1ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	側管		○	○	○						
4	大塚生食注〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	メイン		○	○	○						
5	大塚生食注〔250mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	250ｍL 25ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	側管		○	○	○						
6	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	側管		○	○	○						
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○	○	○						