

獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 PTX+^レム^ブロ^スマ^ブ (6週毎)

レジメン番号 056079

1コースの日数 84

レジメン内容

内服コメント		PTX投与30分前までにジフェルトラミン10mgを5錠内服。必要時ア ^レ ビ ^ト 内服併用。														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	8	15	29	36	43	57	64	71	84 休	
1	生理食塩液「ヒカ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射 (D I V)		ルートキープ用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注 1 0 0 mg〔100mg/4mL〕	50m L 400m g	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○					○					
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○				○						
4	生理食塩液「ヒカ」〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液 1 mg「サウ」〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液 6.6 mg〔2mL/瓶〕 ファモチジン注射液 2 0 mg「ト」〔20mg/2mL〕	100m L 1m g 6.6m g 20m g	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○					○					
5	大塚糖液 5%〔250mL/袋〕 パクリタキセル注	250m L 90m g/m ^l	点滴注射 (D I V)	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○					○					
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○				○						
2	生理食塩液「ヒカ」〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液 1 mg「サウ」〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液 6.6 mg〔2mL/瓶〕 ファモチジン注射液 2 0 mg「ト」〔20mg/2mL〕	100m L 1m g 6.6m g 20m g	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分			○	○	○	○		○	○	○		
3	大塚糖液 5%〔250mL/袋〕 パクリタキセル注	250m L 90m g/m ^l	点滴注射 (D I V)	注入時間 1時間	インラインフィルター使用		○	○	○	○		○	○	○		
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分			○	○	○	○		○	○	○		